

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63

ABONNEMENT ANNUEL

Poste 93)

15 F.

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire
STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

30 Juillet 1964

Supplément N°3 au bulletin du mois de Juillet 1964.

Information

POMMES DE TERRE

DORYPHORES

De nouvelles éclosions sont notées actuellement et cette situation peut motiver la protection des cultures de variétés demi-tardives et tardives.

Surveiller les champs de pommes de terre pour appliquer éventuellement le traitement insecticide qui s'impose (voir produits conseillés sur la liste en votre possession).

MILDIOU (Secteur de montagne)

Opérer un nouveau traitement fongicide dans la période du 3 au 6 Août.

HOUBLON

MILDIOU

L'état sanitaire du houblon vis à vis du Mildiou est en général satisfaisant. Toutefois, compte tenu de la période orageuse actuelle, il importe d'assurer la protection des houblons arrivés à un stade de grande sensibilité (pleine floraison) en exécutant un traitement fongicide avant le 4 Août. Apporter beaucoup de soins à cette pulvérisation.

ARAIGNEES ROUGES

Malgré le temps sec de ces dernières semaines, les Araignées rouges sont encore relativement peu actives. Il convient cependant de surveiller les plantations pour pouvoir appliquer un traitement acaricide approprié dès la reconnaissance de foyers caractérisés.

.../...

199

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES

Les vergers traités correctement selon nos indications sont en bon état sanitaire et exempts de Tavelure.

Là où pour une raison quelconque, cette maladie est présente sur feuilles ou sur fruits, des repiquages sont à craindre et un nouveau traitement devrait être opéré dans les prochains jours. Cette protection devra d'ailleurs être assurée jusqu'à la récolte par des traitements renouvelés en fonction des degrés d'infestation et des conditions météorologiques.

OIDIUM

Renouveler la protection contre l'Oïdium du pommier.

CULTURES MARAÎCHERES DE PLEIN CHAMP

CORNICHONS - SCORSONERES

OIDIUM

On note actuellement un développement marqué de l'Oïdium sur certaines plantes, notamment les cornichons, scorsonères, etc..

Un traitement fongicide pourrait être réalisé avantageusement avec l'emploi d'un soufre mouillable à faible dose (200 gr./Hl) pour éviter les risques de brûlures. En cas de températures élevées, il paraît préférable de choisir le Dinitrophénylcrotonate.

ALTISES

Ces insectes causent actuellement d'importants dégâts dans certaines cultures de choux. On pourra les combattre par des traitements à base d'insecticide chloré ou phosphoré en respectant les limites d'emploi d'utilisation de ces produits. Assurer une bonne mouillabilité du feuillage par l'addition d'un mouillant à la bouillie.

Les Contrôleurs,

J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur,

J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station de Strasbourg
Directeur-Gérant : L. BOUYX.